



VACCINATIONSMEDELGIVANDE

För vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet

Elevhälsan erbjuder alla barn och ungdomar i Sverige vacciner enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Information om vaccinationsprogrammet för barn finns på flera språk på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se

Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information.

Elevens efternamn	Elevens förnamn	Personnummer
Skola		Årskurs och klass

Jag ger mitt/vårt tillstånd till att mitt barn vaccineras mot följande sjukdomar:

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio	Ja	Nej
Vaccin mot polio	Ja	Nej
Vaccin mot mässling påssjuka och röda hund	Ja	Nej
Vaccin mot HPV, humant papillomvirus (gäller endast flickor)	Ja	Nej

Hälsofrågor

Om ja, ange vad/hur

Har eleven allvarlig allergi eller fått allvarlig allergisk reaktion?	
JA NEJ	
Har eleven någon allvarlig kronisk sjukdom? Om ja, ange vad:	
JA NEJ	
Har eleven reagerat kraftigt på tidigare vaccinationer?	
JA NEJ	

Underskrift vårdnadshavare

enskild vårdnadshavare

Datum	Namnförtydligande	Datum	Namnförtydligande
Underskrift		Underskrift	

I de fall det finns två vårdnadshavare ska båda underteckna blanketten

Nationellt vaccinationsregister

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Införandet av det nya vaccinationsregistret sker enligt beslut från riksdagen. Det innebär att Sverige får ett bättre verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt den nya lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn



Informationen nedan är hämtad från bl. a. Folkhälsomyndighetens hemsida

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan infektera sår. Bakterien producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ofta med dödlig utgång. Sjukdomen är inte smittsam. Den kan alltså inte överföras mellan människor.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion med svåra hostattacker som kan pågå i flera månader och medföra följsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara mycket påfrestande och till och med livshotande.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som sprids via avlopp och förorenat vatten. En gång i tiden var det många som dog eller fick förlamningar eller skador för livet på grund av polio även i Sverige. Polio finns nu kvar i endast ett fåtal länder i Afrika och Asien.

Mässling är en mycket smittsam och ofta besvärlig virussjukdom med hög feber, hosta och utslag. Mässling kan leda till följsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen och dödsfall förekommer bland ovaccinerade barn.

Påssjuka är en smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. En vanlig följsjukdom är hjärnhinneinflammation, som kan orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Pojkar som blir sjuka efter puberteten kan drabbas av testikelinflammation, som i sällsynta fall kan leda till sterilitet.

Röda hund är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk finns det risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel.

HPV är en förkortning för humant papillomvirus – det finns många olika HPV-virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70 % av all livmoderhalscancer. Om man vaccinerar sig i unga år, och som vuxen går på de cellprovskontroller man blir kallad till, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med 6 månaders mellanrum.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad och i vissa fall svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland även feber. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet, symtomen brukar gå över på någon dag.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är dock inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning.



Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du framföra klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr.