



VACCINATIONS MEDGIVANDE

Vaccination mot HPV – humant papillomvirus

Vaccinet ges två gånger med 6 månaders mellanrum, till flickor mellan 9 och 13. Från 14 års ålder ges tre doser. Medgivandet gäller alla doserna. Meddela om förutsättningarna ändras mellan sprutorna.

Information om vaccinationer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Där kan du även hitta information på flera språk.

Du kan också vända dig till skolsköterskan för att få mer information

Elevens efternamn	Elevens förnamn	Personnummer
Skola		Årskurs och klass

Jag ger mitt/vårt tillstånd till att mitt barn vaccineras HPV, humant papillomvirus

Ja

Nej

Hälsfrågor

Om ja, ange vad/hur

Har eleven allvarlig allergi eller fått allvarlig allergisk reaktion?	J A NEJ	
Har eleven någon allvarlig kronisk sjukdom?	J A NEJ	
Har eleven reagerat kraftigt på tidigare vaccinationer?	J A NEJ	

Underskrift vårdnadshavare

enskild vårdnadshavare

Datum	Namnförtydligande	Datum	Namnförtydligande
Underskrift		Underskrift	

I de fall det finns två vårdnadshavare ska båda underteckna blanketten

Nationellt vaccinationsregister

Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Införandet av det nya vaccinationsregistret sker enligt beslut från riksdagen. Det innebär att Sverige får ett bättre verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt den nya lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn



HPV

Den 1 januari 2010 infördes vaccination mot HPV i det svenska barnvaccinationsprogrammet. HPV är en förkortning för humant papillomvirus – det finns många olika HPV-virus som bland annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV skyddar mot mer än 70 % av all livmoderhalscancer. Om man vaccinerar sig i unga år, och som vuxen går på de cellprovskontroller man blir kallad till, kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer. För fullgod effekt ges vaccinet två gånger med 6 månaders mellanrum, till flickor mellan 9 och 13 år. Från 14 år och uppåt ges tre doser.

Kan vaccinationen ge besvär?

Vaccinationen ges i överarmen och kan ge rodnad och i vissa fall svullnad och ömhet på injektionsstället, ibland även feber. Detta är inte farligt utan visar att kroppen reagerar på och bearbetar vaccinet, symtomen brukar gå över på någon dag.

När ska man skjuta upp vaccinationen?

Man undviker att vaccinera barn med akut infektionssjukdom och feber eller med tydligt nedsatt allmäntillstånd. Det är dock inget hinder att vaccinera om barnet har en lättare infektion som en vanlig förkylning.

Utbildningskontoret i Sollentuna kommun hanterar personuppgifterna du lämnar i aktuell blankett i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt den svenska dataskyddslagstiftningen. Utbildningsnämnden i Sollentuna kommun är ytterst ansvarig för denna behandling. Vill du framföra klagomål på behandlingen av dina/era personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Mer information finns på www.sollentuna.se/gdpr.